

TEEKONTOR

- Wir sind die Zukunft -



Nur mit diesem Siegel ist es ein Original!

SoftAcid®IV+ E flüssig

Naturprodukte auf höchstem Niveau

Ergänzungsfuttermittel

Sichere Handhabung - Kompromisslose Wirkung

Dosierung und Verabreichung für Brief- u. Rasetauben und Kleingeflügel

SoftAcid®IV+ E ist eine **patentierte Mischung** aus organischen Säuren und modifizierten Ligninsulfonsäuren. Diese spezielle Kombination setzt die Aggressivität von marktüblichen organischen Säuren wie Ameisensäure und Propionsäure deutlich herab. **SoftAcid®IV+ E** ist im Gegensatz zu reinen organischen Säuren nur schwach korrosiv und führt bei Hautkontakt nicht zu Verätzungen. **SoftAcid®IV+ E** wird nicht als Gefahrgut eingestuft.

Die antibakteriellen Eigenschaften von **SoftAcid®IV+ E**, entsprechen denen von Ameisensäure oder Ameisensäure-Propion-Säure-Gemischen.

Verabreichen Sie **SoftAcid®IV+ E flüssig** in den ersten 8 Tagen wie folgt:

1 ml auf 3 ltr. Wasser zur Gewöhnung, 3 Tage

1 ml auf 2 ltr. Wasser zur Vorbeugung, 5 Tage

In der Folgezeit verabreichen Sie die Konzentration von 1 ml auf 2 l Wasser 2x wöchentlich.

Sie können die Tauben bei ernährungsbedingten Darmbeschwerden unterstützen, indem von der Konzentration 1,0-1,5 ml auf 1 ltr. Wasser 10-15 ml direkt in den Kropf gespült wird.

Bei jeder ernährungsbedingten Stresssituation und ernährungsbedingten Mängeln in der Absetzungsphase, vor und nach der Ausstellung, Fütterungswechsel usw. empfehlen wir 1-1,5 ml **SoftAcid® IV+ E** auf 1 Ltr. Wasser.

Fügen Sie dem Badewasser ca. 3 ml auf 10 l zu. Milben und Federlinge haben keine Chance mehr.

Nur für Brieftauben:

Dosierung während der Reise a. als 2. Tränke nach der Rückkehr (z.B. Sonntag abends und Montag morgens oder Samstag abends und Sonntag morgens) b. 1-2 Tage vor dem Einsatz (z.B. Donnerstag abends und Freitag morgens bzw. Mittwoch abends und Donnerstag morgens). Bis zum Einsetzen haben die Tauben noch genügend Zeit, evtl. den Wasserhaushalt zu regulieren.

Verkaufspreise: 9,80 € für 150 ml

Adapter, Dosierungsspritze und 17,50 € für 250 ml

Spritze mit Schlauch für die 30,20 € für 500 ml


Kropfspülung erhalten Sie gratis. 53,00 € für 1000 ml

Ameisen flüchten, wenn in die Gänge und Löcher eine Konzentration von 10 ml SoftAcid®IV+ E auf 1 l Wasser gesprüht wird.

Bei einem Auftragswert unter 30,00 € erfolgt ein Aufschlag von 4,00 € für Porto u. Verpackung.

Das einzige wirksame Mittel auf Naturbasis bei den starken Darmproblemen der Jungtauben

Bockholter Weg 44 · 49757 Werlte · Telefon 0 59 51/99 05 05 · Fax 0 59 51/99 05 06
www.teekontor-werlte.de · e-mail: info@teekontor-werlte.de



Nur mit
diesem Siegel
ist es ein
Original!

Naturprodukte auf höchstem Niveau

Wichtige Hinweise zur Verabreichung von SoftAcid®IV+ E in flüssig und PowerAcid 4+ Pulver bei starken Darmproblemen der Brief- und Rassejunge tauben (sog. Jungtaubenkrankheit)

1. Leichte und knappe Fütterung, am besten Diätfutter. Dieses Futter kann sehr stark mit einer Konzentration von **SoftAcid®IV+ E flüssig** angefeuchtet oder mit **Power Acid 4 + Pulver** angemischt werden. (flüssig - 1 ml auf 1 ltr. Wasser, Pulver 1 TL mit Wasser zu einem Brei mischen und unter 1 kg Futter rühren). Beide Mischungen mit Xentasan abbinden.
2. Das Wasser in der Tränke wird angereichert an den beiden ersten Tagen mit **SoftAcid®IV+ E** in flüssig in der Konzentration von 1 ml auf 1 ltr. Wasser, an den folgenden Tagen von 1,5 - 2 ml auf 1 ltr. Wasser.
3. Die Jungtauben sollten nicht trainiert werden, weder am Haus, noch bei einem Vor- oder Preisflug.
4. **PowerAcid 4+ Pulver**, 1 Esslöffel mit Wasser zu einem Brei verrühren, mit 1 kg Futter vermischen. Nicht mit einem anderen Produkt abbinden, sondern trocknen lassen und dann den Tauben füttern.
5. **PowerAcid 4+** darf in der Dose nicht mit Wasser in Berührung kommen.
6. **Wichtig bei der Verabreichung von SoftAcid®IV+ E flüssig.** SoftAcid®IV+ E flüssig in einer hochkonzentrierten Form entzieht dem Körper Mineralien. Feuchten Sie das Futter bei den ersten Anzeichen der Gesundung mit Thülsfelder Mix über das Diätfutter an und binden es mit Xentasan ab. Xentasan besteht zu ca. 66% aus Mineralith, ca. 20 % Bierhefe, ca. 10 % Saccharose, ca. 3 % pflanzlichen Fettsäuren und ca. 1% Vitamin D3.
7. Desinfizieren Sie täglich den Boden und vor allem die Sitzplätze nach vorheriger Reinigung mit **SoftAcid®IV+ E** in der Konzentration von 4 ml auf 1 Liter Wasser.
8. Sollten Sie dann noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte sofort an. Wir stehen Ihnen auf Grund unserer Erfahrungen immer zur Seite.

9. Jungtaubenkrankheit

Bei starkem Befall (Erbrechen, schleimiger Kot, usw.) empfehlen wir Ihnen, sofort Kontakt aufzunehmen mit der Taubenpraxis Am Weinberg André Pfützner unter der Telefonnummer: 0 35 37 - 20 23 25. Schnelle, unproblematische und kostengünstige Hilfe wird von Herrn Pfützner garantiert. Sollte er nicht anwesend sein, hinterlassen Sie die Tel.-Nr. und den Zeitpunkt, wann Sie am besten zu erreichen sind. Herr Pfützner ruft auf jeden Fall zurück.

Brieftauben

Gehen Sie davon aus, dass Jungtauben bei jedem Flug irgendein Problem mitbringen. Vor und nach jedem Flug muss das Immunsystem unterstützt werden. Sollten bereits die Darmprobleme vorüber sein, bekommen Sie keine Garantie, dass die Tauben in 4 Wochen nicht wieder davon befallen werden. Haben Sie keine Angst mehr vor diesen Problemen. Gehen Sie nach Plan vor und nehmen eventuell telefonisch Kontakt auf.